

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тетрацида S для оптимизации процессов пищеварения у свиней

(организация-производитель фирма «Vetagro S.p.A»/«Ветагро С.п.А», Италия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Тетрацид S (Tetracid S) – кормовая добавка для оптимизации процессов пищеварения у свиней.
2. Тетрацид S содержит в качестве действующих веществ фумаровую кислоту (19,0%), лимонную кислоту (9,0%), сорбиновую кислоту (11,0%), яблочную кислоту (9,0%), ароматические эфирные масла тимьяна и ванили идентичные натуральным (2,8%), тимол (2,4%); а также вспомогательные компоненты – гидрогенизированные растительные жиры (45,5%) и диоксид кремния (3,7%). Предельные отклонения от указанных данных не должны превышать 10%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду Тетрацид S представляет собой микрокапсулы желто-коричневого цвета со специфическим запахом.

4. Выпускают расфасованным по 25 кг в бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, сведений о сертификации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке организации-производителя в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 15°C до 25°C.

Срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Не использовать по окончании срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Органические кислоты, входящие в состав Тетрацида S, подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте свиней, способствуют оптимизации процессов пищеварения, подавляя

гнилостные процессы и активизируя работу ферментов.

В результате применения добавки увеличивается поедаемость корма, повышается интенсивность роста и сохранность свиней.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Тетрацид S применяют для оптимизации процессов пищеварения у свиней.

7. Кормовую добавку вносят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Нормы ввода в корм в зависимости от возраста животных составляют:

- пороссятам-отъемышам – 2,0 кг/т корма;
- пороссятам на доращивании – 0,75 – 2,0 кг/т корма;
- пороссятам на откорме – 0,3 – 0,5 кг/т корма;
- свиноматкам – 1,0 – 2,0 кг/т корма.

8. При применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.

9. Тетрацид S совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

10. Продукцию свиноводства после применения Тетрацида S можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с кормовой добавкой Тетрацид S следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных: использовать средства индивидуальной защиты (защитную одежду, перчатки ПВХ, респиратор, защитные очки).

12. Во время работы запрещается пить, курить, принимать пищу.

13. При попадании Тетрацида S на кожу – смыть водой с мылом, попадании в глаза – немедленно промыть их под струей чистой воды в течение 15 минут.

14. Хранить в местах, недоступных для детей

Инструкция разработана фирмой «Vetagro» (Италия) совместно с ООО «Ветагро» (г. Москва).

Адрес организации-производителя: «Vetagro S.p.A» Via Porro, 2 - 42124 Reggio Emilia, Italy.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»
Регистрационный номер ПВИ-2-2.0/03119